

Wees alert op duponchelia

Het najaar is bij uitstek de periode om alert te zijn op schimmels zoals botrytis. De rupsen van duponchelia kunnen in deze periode ook voor een verrassing zorgen. Vroegtijdige signalering van deze plaag is dan ook een must.

Vooraf in gerbera en in diverse bloeiende en niet bloeiende potplanten, zoals begonia, cyclaam, kalanchoë, zamioculcas, schefflera en ficus, kunnen de rupsen ernstige schade toebrengen.

Gericht toepassen en herhalen

Snel reageren met een gerichte bespuiting met Turex in het hart van de planten beperkt de schade tot een minimum. Door de verborgen levenswijze van duponchelia is het belangrijk dat er voldoende spuitvloeistof wordt gebruikt. De rups vreet in gewassen als begonia en cyclaam aan stengelvoet en wortelhals. De aangevreten stengel is een goede invalspoort voor allerlei schimmels en bacteriën. Het is dan ook belangrijk dat de rups tijdens de vraat in een zo kort mogelijke tijd voldoende Bt-middel binnen krijgt.

Advies Turex:

- Start zodra de motten worden gesignaleerd of bij de eerste vraatschade.
- Dosering: 50 gram per 100 liter water / 1kg per ha.
- Bespuiting na 5-7 dagen herhalen.
- pH van de spuitvloeistof moet tussen 5 en 7 liggen.
- Veilig voor natuurlijke vijanden.

Bas van Diemen
Technisch adviseur glastuinbouw
06-53730535