

Biox-M

Toelatingsnummer: 13493 N W.1

Aard van het preparaat: heet vernevelbaar concentraat

Werkzame stof: groenemuntolie

Gehalte: 100%

Inhoud: 20 L



GEVAAR

Gevarenaanduidingen:

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelen:

Inademing van nevel vermijden.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding dragen.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)). GEEN braken opwekken.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als kiemremmingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een ruimtebehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-Gebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per bewaarcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Consumptie-aardappel	Voorkomen van spruitvorming	30-90 ml/1000 kg aardappelen**	11	21
Zetmeelaardappel	Voorkomen van spruitvorming	30-90 ml/1000 kg aardappelen**	11	21

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** eerste toepassing 90 ml middel per 1000 kg aardappelen, daarna 30 ml middel per 1000 kg aardappelen.

Overige toepassingsvoorwaarden

Toepassing uitsluitend in buitenluchtgekoelde en/of mechanisch gekoelde bewaarplaatsen voorzien van een geforceerd ventilatiesysteem. De termijn tussen de laatste behandeling en het in verkeer brengen van de behandelde partijen niet korter mag zijn dan 12 dagen.

Belangrijk:

- De te behandelen aardappelen moeten droog, enigszins afgehard en zoveel mogelijk vrij van grond zijn.
- Zieke en beschadigde knollen verwijderen en de aardappelen egaal -zonder stortkegels- inschuren.
- Na het aanzetten van de toepassingsapparatuur dient de opslag zo spoedig mogelijk te worden verlaten. Wel dient toezicht gehouden te worden op de ingezette apparatuur tijdens de toepassing.
- Tijdens het vernevelen van BIOX M mogen geen personen in de opslag aanwezig zijn.
- Na het einde van de behandeling mag de opslag pas na minimaal 24 uur na het luchten worden betreden.
- BIOX M is niet verenigbaar met andere werkzame stoffen.
- BIOX M is een ready-to-use heetnevelconcentraat, welke alleen met daarvoor aanbevolen apparatuur mag worden toegepast.

Tijdstip en wijze van toepassing:

De eerste behandeling uitvoeren, direct na het afharden, maximaal 3 weken na het inschuren van de aardappelen, en in ieder geval voordat spruitvorming wordt geconstateerd.

De deuren en de externe ventilatieopeningen van de bewaarplaats moeten tijdens en na de behandeling gesloten zijn. Tijdens de behandeling wordt BIOX M d.m.v. de interne ventilatie door de partij verdeeld.

Voor een goede verdeling is het nodig intern te ventileren vanaf de aanvang van de behandeling tot 30 minuten na het einde van de behandeling. Hierna dient de behandelde ruimte 6 – 12 uur gesloten te worden houden, waarbij, om de herverdeling gunstig te

CERTIS

Als opbrengst telt

beïnvloeden tussentijds intern kan worden geventileerd. Vervolgens kan normaal extern worden geventileerd om het juiste temperatuurniveau te handhaven.