

FireBlocker

Toelatingsnummer: 15274 N

Formulering: Suspensie concentraat

Werkzame stof: mepanipyrim

Gehalte: 440 G/L

Inhoud: 5 l



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt huidirritatie. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. **BIJ CONTACT MET DE HUID:** Met veel water en zeep wassen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de teelt van bloembol- en knolgewassen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden (*Trichogramma cacoeciae*). Vermijd onnodige blootstelling.

Resistentiemanagement:

Om de kans op resistentieontwikkeling van *Botrytis* spp. in bloembol- en knolgewassen te beperken moet FireBlocker altijd worden toegepast in combinatie met een toegelaten middel tegen vuur met een preventieve werking in de daarvoor geldende dosering.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling.

FireBlocker is een preventief werkend fungicide en grijpt in op diverse stadia van het infectieproces van de schimmel.

FireBlocker niet bewaren bij een temperatuur onder 0°C.

Toepassingen

Teelt van bloembol- en knolgewassen, waaronder tulp, lelie en gladiool, ter voorkoming van een aantasting door vuur (*Botrytis spp.*)

Regelmatig een behandeling uitvoeren vanaf opkomst van het gewas tot ongeveer 2 weken voor de oogst. Afhankelijk van de ziektedruk en weersomstandigheden de behandeling om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,35 liter FireBlocker per hectare + een preventief werkend fungicide.