

## Olie-H

**Toelatingsnummer:** 6598 N W.9

**Aard van het preparaat:** emulgeerbaar concentraat

**Werkzame stof:** paraffine olie

**Gehalte:** 96%

**Inhoud:** 20, 200, 1000 l



**GEVAAR**

### **Gevarenaanduidingen:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

### **Voorzorgsmaatregelen:**

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC))

GEEN braken opwekken.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### **Aanvullende etiketinformatie:**

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### **Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitiefst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering middel per toepassing*	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Poot aardappel	overdracht van non-persistente virussen door bladluizen	6,25 l/ha <sup>1</sup>	12	Tussen 1 <sup>e</sup> en 2 <sup>e</sup> toepassing 3 dagen, tussen volgende toepassingen 7 dagen  7 dagen
bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)	overdracht van non-persistente virussen door bladluizen	6,25 l/ha <sup>1</sup>	25	7

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

<sup>1</sup> in combinatie met een daarvoor toegelaten insectenbestrijdingsmiddel.

### **Overige toepassingsvoorwaarden**

Mogelijk gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geledpotigen/insecten te beschermen is toepassing in de teelten van pootaardappel en bloembollen en bloemknollen uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90 in combinatie met een teeltvrije zone van minimaal 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelgrens/insteek van de sloot).

De werking kan variabel zijn. Dit middel kan bijdragen aan de beheersing van overdracht van virussen.

In pootaardappel en bloembollen en bloemknollen is opbrengstderving ten gevolge van de bespuitingen mogelijk.

### **Aanbevelingen**

#### **Algemeen**

Olie H voorkomt de overdracht van non-persistente virussen door bladluizen.

#### **Klaarmaken spuitvloeistof**

Voeg bij het klaarmaken van de spuitvloeistof middelen tegen Phytophthora als eerste toe. Voeg daarna middelen tegen insecten toe en als laatste Olie-H.

#### **Pootaardappel**

Om virusinfectie van het gewas te verminderen het loof vanaf de opkomst tot een week voor het doodspuiten of looftrekken regelmatig bespuiten.

Toepassing:

1e bespuiting: zodra ongeveer 90% van de planten is opgekomen.

2e bespuiting: 3 à 4 dagen na de eerste bespuiting.

3e en volgende bespuitingen: wekelijks herhalen tot één week voor het doodspuiten of looftrekken.

De behandeling uitvoeren op een droog gewas, bij voorkeur tegen de avond bij bewolkte hemel.

Er dient rekening te worden gehouden met opbrengstderving tengevolge van de bespuitingen. De mate waarin deze bij verschillende rassen kan optreden is onvoldoende bekend.

## **Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt):**

### **Lelies en tulpen**

Gewasbespuitingen met Olie-H verminderen de verspreiding van non-persistente virussen, met name tulpenmozaïekvirus en symptoomloos lelievirus.

Toepassing:

Lelies: de bespuiting wekelijks uitvoeren in mei, juni en juli en om de 10 dagen in augustus/september.

Tulpen: vanaf de eerste week in mei tot half juni wekelijks een bespuiting uitvoeren.

Menging met middelen ter bestrijding van “vuur” is mogelijk

Menging met andere merken olie wordt ontraden

Toepassing in de namiddag of avond heeft de voorkeur

### **Hyacinten**

Vanaf opkomst tot kort voor het rooien wekelijks een bespuiting uitvoeren. Deze toepassing kan in het bijzonder worden aanbevolen bij de teelt van werkbollen en van pluis. Toepassing moet worden ontraden op cultivars, die gevoelig zijn voor geelziek en op partijen, waarin tijdens de bewaring geelzieke bollen zijn gevonden, of waarin in het voorjaar geelziek is aangetroffen.

Menging met middelen ter bestrijding van “vuur” is mogelijk.