

## Shorttrack 85 SG

**Toelatingsnummer:** N15660 W0

**Formulering:** wateroplosbaar granulaat

**Werkzame stof:** daminozide

**Gehalte:** 850 G/KG

**Inhoud:** 2,5 KG



**GEVAAR**

### Gevarenaanduidingen:

Veroorzaakt ernstig oogletsel

### Voorzorgsmaatregelen:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Onmiddellijk een arts raadplegen.

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORL richtlijn op deze verpakking.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

### Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als groeiregulator voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

### Toepassingsvoorwaarden:

Toepassings-gebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximal e dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassing in dagen
Bloemisterij-gewassen (bedekte teelt)	Groeiremming , compacte planten, beïnvloeding lengte zijscheuten	50 – 500 g/hl	5 kg/ha	12 per teeltcyclus , 72 per 12 maanden	15 kg per teeltcyclus , 90 kg per 12 maanden	5

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerijgewassen (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Groeiremming, compacte planten, beïnvloeding lengte zijscheuten	50 – 500 g/hl	5 kg/ha	12 per 12 maanden	15 kg per 12 maanden	5
Vaste plantenteelt (bedekte, niet-grondgebonden teelt)	Groeiremming, compacte planten, beïnvloeding lengte zijscheuten	50 – 500 g/hl	5 kg/ha	12 per 12 maanden	15 kg per 12 maanden	5

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

### Overige toepassingsvoorwaarden

Drag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Dosering en aantal toepassingen is afhankelijk van diverse factoren o.a.: de groei­kracht van de cultivar en de groeiomstandigheden. Het verdient aanbeveling in alle gevallen via een proefbespuiting zelf de juiste dosering, het goede spuitmoment en het aantal toepassingen vast te stellen.

Het verdient aanbeveling, in verband met kans op gewasschade, middels een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt. Met name in Kalanchoë kan een gewasschade optreden, afhankelijk van de variëteit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

### Aanbevelingen

Het oplossen van het middel moet zorgvuldig gebeuren. De benodigde hoeveelheid in een ruime hoeveelheid water oplossen en roeren tot de vloeistof volkomen helder is geworden. Daarna aanvullen tot de gewenste dosering is bereikt.