

Valbon

Toelatingsnummer: 14667 N W.3

Formulering: Water dispergeerbaar granulaat

Werkzame stof: bentiavalicarb-isopropyl en mancozeb

Gehalte: 12,5 g/kg en 700 g/kg

Inhoud: 10 kg



Waarschuwing



Gevarenaanduidingen:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Stof en spuitnevel niet inademen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Inhoud/verpakking afvoeren volgens STORL richtlijn op deze verpakking.

Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel

van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden

versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Werkzaamheid getoetst op	dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Aardappelen	Aardappelziekte ¹	2,0 kg/ha	8	9 (voor sluiting van het gewas, BBCH 40)	7
				7 (vanaf sluiting van het gewas, BBCH 40)	
Uien	Valse meeldauw ²	2,0 kg/ha	6 toepassingen verdeeld over 2 blokken van 3 toepassingen	14** (voor begin bolvorming, BBCH 40) binnen blok	28
				7** (vanaf begin bolvorming, BBCH 40) binnen blok	
Sjalotten	Valse meeldauw ²	2,0 kg/ha	6 toepassingen verdeeld over 2 blokken van 3 toepassingen	14** (voor begin bolvorming, BBCH 40) binnen blok	28
				7** (vanaf begin bolvorming BBCH 40) binnen blok	

Toepassingsvoorwaarden:

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** Interval tussen twee blokken minimaal 30 dagen.

1 Aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

2 Valse meeldauw (*Peronospora destructor*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 L water/hectare.

Om de vogels te beschermen is toepassing in de teelt van zaaiuien, eerste en tweedejaars plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien, voor BBCH 40 (wanneer bolvorming begint) uitsluitend toegestaan indien een interval van 14 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen. Vanaf gewasstadium BBCH 40 (begin van bolvorming) geldt een minimum interval van 7 dagen.

Om de vogels te beschermen is toepassing de in teelt van aardappelen vóór BBCH 40 (sluiting van het gewas) uitsluitend toegestaan indien een interval van ten minste 9 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen. Vanaf gewasstadium BBCH 40 (sluiting van het gewas) geldt een minimum interval van 7 dagen.

Om niet-doelwitarthropoden te beschermen, is de toepassing in aardappelen uitsluitend toegestaan als gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende doppen.

Aanbevelingen

Valbon heeft zowel een preventieve als beperkt curatieve werking.

Toepassingsmoment

Aardappelen

Toepassen vanaf opkomst tot sluiting van het gewas. Afwisselen met een ander middel bij een korter interval dan 9 dagen.

Na sluiting van het gewas toepassen om de 7 dagen.

Uien en sjalotten

Starten met de toepassing vanaf het moment dat de planten elkaar in de rij beginnen te raken.