

Valbon

Toelatingsnummer: 12667 N W.2

Formulering: Water dispergeerbaar granulaat

Werkzame stof: bentiavalicarb-isopropyl en mancozeb

Gehalte: 12.5 g/kg en 700 g/kg

Inhoud: 10 kg



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Voorkom lozing in het milieu.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbeschermingdragen.

NA(mogelijke)blootstelling:een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Inhoud/verpakking afvoeren naar de daartoe bestemde locaties volgens locale/regionale/nationale regelgeving.

Aanvullende etiketelementen:

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling:

a. in de teelt van consumptie-, zetmeel- en poot aardappelen;

b. in de teelt van zaaiuien, eerste en tweedejaars plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien.

Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

7 dagen: voor consumptie-, zetmeel- en poot aardappelen;

28 dagen: voor zaaiuien, eerste en tweedejaars plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien.

Om de vogels te beschermen is toepassing in de teelt van zaaiuien, eerste en tweedejaars plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien, voor BBCH 40 (wanneer bolvorming begint) uitsluitend toegestaan indien een interval van 14 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

Algemeen

Het middel bevat de preventief werkende component mancozeb alsmede de component bentiavalicarb-isopropyl met zowel preventieve als beperkt curatieve werking. Valbon dient preventief te worden toegepast.

Toepassingen

Poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen, ter voorkoming van aantasting door aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

Indien nodig vanaf opkomst van het gewas regelmatig toepassen om de 7-14 dagen, afhankelijk van het ras, de gewasontwikkeling, de weersomstandigheden en de ziektedruk. Vóór BBCH 40 (sluiting van het gewas) is toepassing uitsluitend toegestaan indien een interval van 9 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen. Maximaal 8 toepassingen per teeltseizoen.

Dosering: 2,0 kg per hectare

Zaaiuien, eerste en tweede jaars plantuien, zaaisjalotten, plantsjalotten, picklers en zilveruien, ter bestrijding van valse meeldauw (*Peronospora destructor*).

Vanaf het moment dat de planten elkaar in de rij beginnen te raken toepassen in 2 blokken van ieder maximaal 3 toepassingen. Interval tussen toepassingen binnen één blok 7 tot 14 dagen, tussen de twee blokken 30 dagen. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden, ras en gewasontwikkeling. Voor BBCH 40 (wanneer bolvorming begint) is toepassing uitsluitend toegestaan indien een interval van 14 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen.

Dosering: 2,0 kg middel per hectare.