

# ProteCtie Akkerbouw

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

## De betrouwbare partner tegen spruitvorming in uien




**Uien worden vaak voor langere tijd bewaard. Spruitvorming kan leiden tot aanzienlijke gewichtsverliezen en uitval. Het is dus van groot belang om de kans op spruitvorming te reduceren. Crown® MH is daarbij een zeer betrouwbare partner. Een tijdige gewasbespuiting met deze gebruiksvriendelijke, vloeibare spuitremmer brengt uw uien in topconditie voor lange bewaring.**

De afzet van uien is sterk afhankelijk van de vraag uit binnen- en buitenland. Kwalitatief hoogwaardige en langdurig houdbare uien geven u als teler de beste marktpositie. Daarvoor besteedt u de best mogelijke zorg aan de teelt, het juiste oogsttijdstip, een zorgvuldige loofverwijdering, de oogst- en droogmethode en uiteraard aan goede bewaaromstandigheden. Een gewasbespuiting met Crown® MH als het gewas begint te strijken onderdrukt de spruitvorming langdurig. Hierdoor kunt u uw uien langer zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies bewaren en beperkt u het gewichtsverlies tijdens de bewaring.

### Werking

Met Crown® MH beschikt de teler over een nieuw ontwikkelde, vloeibare formulering (270 g/l) van de vertrouwde werkzame stof maleïnehydrazide. Door de gebruiksvriendelijke vloeibare SL formulering is het product snel in de spuitoplossing te verdelen. Dankzij de systemische werking wordt het na opname door het blad via de neerwaartse sapstroom naar de bol



*Diagram 1. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat een gewasbespuiting met het gebruiksvriendelijke Crown® MH de spruitvorming zeer effectief onderdrukt.*



getransporteerd, waar het de spruitvorming zeer effectief remt. Maleïnehydrazide stopt de celdeling, maar laat de celgroei en celstrekking ongemoeid.

### Toepassing en dosering

Crown® MH is toegelaten in alle uienteelten (zaaiuien, zilveruien, picklers en 2e jaars plantuien) met uitzondering van eerstejaars plantuien. De etiketdosering is 8,9 l/ha. Een uitvloeier versterkt het effect van de bespuiting. Gebruik tenminste 500 liter water en spuit met een niet te grove druppel. Voor een goede opname en werking moet het gewas na de bespuiting nog minstens twee weken gezond en vitaal blijven.

Voer de bespuiting uit bij groeizaam weer, onder warme weersomstandigheden bij voorkeur 's avonds. Voor een goede opname moet het na de bespuiting minimaal 10 uur droog blijven.

Pas Crown® MH met uitvloeier toe als een aparte gewasbespuiting, niet gemengd met andere middelen. Maak de spuittank en het spuitmateriaal na gebruik grondig schoon.

### Bij begin strijken

Voor een goed resultaat is het belangrijk Crown® MH op het juiste moment toe te passen in een gewas met een regelmatige stand en afrijping. Spuit wanneer het gewas begint te strijken. Het loof neemt het middel dan goed op.

**Praktijkadvies**  
**8,3 l/ha**



**Crown® MH zet de kroon op uw werk.**

**Vloeibaar geeft gebruiksgemak!**



### De voordelen van Crown® MH

- Zeer effectief tegen spruitvorming
- Vloeibaar, dus snel te verwerken
- Bevordert de houdbaarheid
- Beperkt het gewichtsverlies tijdens bewaring
- Toegelaten in alle uienteelten m.u.v. eerstejaars plantuien

Crown® MH is een geregistreerd handelsmerk van Kreglinger Europe N.V.  
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

**CERTIS**  
Als opbrengst telt

Certis Europe B.V. Postbus 1180 3600 BD Maarssen Safariweg 55 3605 MA Maarssen  
T 0346 29 06 00 E info@certiseurope.nl I www.certiseurope.nl