

# ProteCtie Glasgroenten

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming


## Dé aanwinst tegen echte meeldauw, *Botrytis* en *Mycosphaerella*



*Mycosphaerella* in komkommer (WUR Glastuinbouw)

**Frupica®**, effectief tegen echte meeldauw, *Botrytis* en *Mycosphaerella*, is nu ook toegelaten in de teelt van courgette, komkommer, aubergine en tomaat. Het middel is zacht voor het gewas en heeft een veiligheidstermijn van 1 dag.

Frupica werkt in op diverse stadia van schimmelziekten tijdens het infectieproces. Het voorkomt onder andere de groei van de kiembuis en remt de ontwikkeling van mycelium in het blad. Het kiemproces van de schimmel wordt hierdoor niet voltooid, waardoor deze niet in het blad kan binnendringen. De werkzame stof wordt snel lokaal systemisch opgenomen door de plant en heeft een lange duurwerking. Toepassing bij een beginnende aantasting heeft het meeste effect.



Voorkomt groei kiembuis en vorming appressorium

Remt ontwikkeling van mycelium in het blad. (*Botrytis*)

Infectieproces van *Botrytis* en echte meeldauw

### Resistentiemanagement

Frupica bevat de werkzame stof mepanipyrim en is geformuleerd als suspensie concentraat (SC). Deze stof behoort tot de groep anilino-pirimidinen (FRAC 9). Het werkingsmechanisme is zeer specifiek. Pas het daarom niet vaker toe dan twee keer per teeltcyclus. Wissel na toepassing af met middelen uit een andere chemische groep.

### Werkingsspectrum


Frupica heeft een brede werking. Het middel is bewezen effectief tegen echte meeldauw, *Mycosphaerella* en *Botrytis* met slechts één werkzame stof. Onder lichtarme omstandigheden kunnen jonge vruchtgroentegewassen wat gevoelig zijn voor het middel. Voer onder



dergelijke omstandigheden eerst een proefbespuiting uit om de veiligheid voor het gewas vast te stellen.

### Echte meeldauw

Frupica is effectief tegen echte meeldauw. Bij het verschijnen van de eerste vlekken is het advies om Frupica 2x te spuiten met een interval van een week.



### Mycosphaerella

In diverse onderzoeken, onder andere bij Wageningen UR Glastuinbouw, heeft Frupica bewezen uitstekend te werken op *Mycosphaerella*. Zet het middel tegen *Mycosphaerella* preventief in en spuit 2x met een interval van 7 dagen.

### Botrytis

Frupica is al vele jaren toegelaten in de teelt van bloemisterij, aardbeien en bloembollen. In deze teelten staat het bekend als een sterke botrytisbestrijder. Een preventieve aanpak werkt het beste. Spuit daarom op het moment dat u de eerste aantasting ziet.

### Toepassing

- Dosering: 90 ml per 100 liter water, maximaal 0,9l/ha
- Voeg (super)uitvloeier toe
- 2 toepassingen per teeltcyclus
- Wissel af met middelen uit een andere chemische groep om resistentie te voorkomen

**Frupica® waakt over uw gewas!**



### De voordelen van Frupica®

- Effectieve schimmelbestrijding met duurwerking
- Tegen echte meeldauw, *Botrytis* én *Mycosphaerella*
- Perfecte afwisselpartner
- Veilig voor natuurlijke vijanden
- Veiligheidstermijn 1 dag

Frupica® is een geregistreerd handelsmerk van Kumiai Co. Ltd., Tokyo, Japan.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

**CERTIS**  
Als opbrengst telt

Certis Europe B.V. Postbus 1180 3600 BD Maarssen Safarieweg 55 3605 MA Maarssen

T 0346 29 06 00 E info@certiseurope.nl I www.certiseurope.nl