

# Protectie Sierteelt

Technische productinformatie voor effectieve gewasbescherming

## Frupica® voorkomt echte meeldauw en Botrytis



Het breed werkende fungicide Frupica® is toegelaten in alle bedekte en onbedekte teelten van siergewassen. De actieve stof mepanipyrim is zeer effectief tegen echte meeldauw en Botrytis. Frupica® is zacht voor het gewas.

Echte meeldauw of 't wit vormt in veel bloemisterijgewassen een groeiend probleem. Door de toenemende biologische bestrijding kan er namelijk minder gezwaveld worden. Botrytis maakt een opleving door in teelten waar door de gestegen energiekosten minder wordt gestookt en een hogere vochtigheid heerst. Frupica® biedt tegen beide ziekten uitkomst door zijn brede, preventieve werking en zachtheid voor het gewas.

### Werkingsmechanisme

De actieve stof mepanipyrim (440 g/l) pakt schimmels op diverse plaatsen in het infectieproces aan. Het voorkomt zowel de groei van de kiembuis als de vorming van een appressorium en het binnendringen in het blad. Daarnaast remt het de ontwikkeling van mycelium in het blad. Frupica® wordt snel in de plant opgenomen (lokaal systemisch) en is regenvast. Het residu geeft een goede nawerking.

Frupica® werkt vooral preventief. Mepanipyrim behoort tot de groep van de anilino-pyrimidinen. Het werkingsmechanisme is zeer specifiek. Pas Frupica® daarom niet vaker toe dan twee keer per teelt of seizoen en wissel af met middelen uit andere chemische groepen.

### Echte meeldauw en Botrytis


Tot het brede werkingspectrum van Frupica® behoren echte meeldauwsoorten zoals Erysiphe (o.a. in Aster en Helianthus) en Spaerotheca (Roos). Pas Frupica® toe zodra de eerste meeldauw zichtbaar is.

Botrytis steekt vooral onder vochtige omstandigheden de kop op. Ook na de oogst kan de schimmel zich snel vestigen in bloemen en bladeren. Een preventief schema met Frupica® voorkomt dat de schimmel aanslaat.

### Preventieve werking op Botrytis in roos

Toepassing 2x, interval 7 dagen

(kunstmatige besmetting met Botrytis na toepassing)








## Toepassing

- Zet Frupica® preventief in.
- Spuit in een concentratie van 0,09% (90 ml per 100 liter water, max. 0,9 l/ha), bij rozen altijd in combinatie met 0,02% Silwet Gold uitvloeier (maximaal 200 ml/ha).
- Herhaal de bespuiting (blokbespuiting)
- Gebruik Frupica® maximaal 2x per teelt of teeltseizoen.


## Ook in Buitenteelten

Frupica® is breed toegelaten in alle bedekte en onbedekte siergewassen. Ook in buitenteelten, zelfs bij lage temperaturen, voorkomt Frupica® echte meeldauw en Botrytis.

Toepassing tegen echte meeldauw in roos



Toepassing tegen echte meeldauw in gerbera



## De voordelen van Frupica®

- Brede werking tegen o.a. echte meeldauw en Botrytis
  - Uitstekende preventieve werking
  - Zacht voor het gewas
  - Ook toegelaten in buitenteelten
- Frupica® waakt over uw gewas!**

Frupica® is een geregistreerd handelsmerk van Kumiai Co. Ltd., Tokyo, Japan.

Lees voor het gebruik eerst het etiket.