



Juli 2018

## Inzet Crown MH in vroege aardappelen

Vroege (tafel) aardappelen zijn al behoorlijk ontwikkeld. Door de huidige droge en warme weersomstandigheden vraagt de inzet van Crown MH voor de kiemremming of vermindering van aardappelopslag extra aandacht.

### Spuitmoment: tot 3 weken voor loofdoding

Voor een optimale werking is minimaal 3 weken (optimaal 5) tussen spuiten en loofdoding of afsterven nodig. Voor de nu al zeer vroeg afrijpende gewassen de minimale periode van 3 weken aanhouden. Spuit wanneer de actieve loofgroei en de bloei voorbij zijn.

### Alleen vitale gewassen

Een goede opname van het middel kan alleen optimaal verlopen als het gewas niet lijdt aan stress waardoor de sapstroom niet meer optimaal verloopt. Maak een inschatting of het loof op het moment van toepassing, nog minimaal 3 weken voldoende groen en vitaal blijft.

### Droog en warm: wat nu?

Als het gewas niet meer actief groeit door te droge en warme omstandigheden dan de bespuiting uitstellen. Bij de huidige hoge temperaturen (> 25 °C) een bespuiting in de avond uitvoeren. Wordt een gewas beregend, dan 24 uur na beregening spuiten op een droog gewas.

### Advies

- Spuitmoment 3 (tot 5) weken voor verwachte loofdoding
- Toepassen als actieve loofgroei en bloei voorbij zijn.
- Bij droogte stress de bespuiting uitstellen.
- Spuit op vitaal gewas.
- Bij huidige warme weer in de avond spuiten
- Dosering 11 ltr/ha

Lees voor meer informatie [hier](#) de Crown MH Protectie of ga naar de website: [www.crownmh.nl](http://www.crownmh.nl)

*Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.*

**Certis Europe B.V.**

info@certiseurope.nl • [www.certiseurope.nl](http://www.certiseurope.nl)

