



Juni 2018

## Wittevlieg in tomaat

In tomaat en andere vruchtgroenteteelten is op een aantal plaatsen te veel wittevlieg aanwezig. In geval van virusproblemen is iedere wittevlieg er één teveel.


Twee integreerbare oplossingen zijn BotaniGard WP en ER II. BotaniGard is larvenbestrijder, terwijl ER II zich richt op de volwassenen en eieren.

### ER II

ER II bestrijdt eieren en volwassen wittevlieg. In tomaat bevinden deze stadia zich in de kop van de plant. Het advies is alleen de kop van de plant spuiten. De wittevlieg is hierdoor gericht te bestrijden en de natuurlijke vijanden en vruchten die zich lager in het gewas bevinden, worden ontzien.

### BotaniGard

Voor de larven en poppen van wittevlieg zijn gevoelig voor BotaniGard. De larven en poppen bevinden zich daar, waar ook de nuttigen zich bevinden. BotaniGard is veilig voor deze nuttigen en is daardoor een veilig extra hulpmiddel. Het raken van de larven is een must voor een goede bestrijding. Zowel de kaswitevlieg als *Bemisia tabaci* zijn gevoelig voor BotaniGard. Combineren met fungiciden is in veel gevallen mogelijk. Klik [hier](#) voor het nieuwe, actuele tankmix overzicht.



### Advies

Spuit bij aanwezigheid van veel volwassenen en eieren ER II door de kop van de plant bij snel drogende omstandigheden. Zet BotaniGard WP in als ondersteuning van de nuttigen en spuit het gehele gewas. Een hoge RV zorgt voor een snellere kieming van de sporen. Voer de bespuiting daarom bij voorkeur aan het einde van de dag uit.

Op onze website vindt u meer informatie over [ER II](#) en [BotaniGard](#).

Neem bij vragen contact op met:

Irma Lukassen      Technisch adviseur      06-53730535  
Lianne van Wijk      Technisch adviseur      06-51605779

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

**Certis Europe B.V.**

info@certiseurope.nl • [www.certiseurope.nl](http://www.certiseurope.nl)



Gewijzigde veldcode

Gewijzigde veldcode